

Rodspidsamputation

Om indgrebet

En rodspidsamputation (apikoektomi) udføres, når en rodbehandlet tand fortsat er inficeret, og infektionen ikke kan behandles tilstrækkeligt via tandkronen. Under indgrebet fjernes rodspidsen og det inficerede væv, og rodkanalen lukkes fra spidsen. Indgrebet kan redde tanden.

Indgrebet udføres i lokalbedøvelse og tager typisk 45–90 minutter afhængigt af tandens placering og anatomi.

Efter behandlingen

- Undgå at spytte, suge, skylle kraftigt eller røre ved såret de første 24 timer.
- Spis kold, blød kost i de første 24 timer. Spis herefter blød mad i 5 dage.
- Undgå rygning i mindst 5 dage – det hæmmer heling og øger infektionsrisikoen.
- Start med at skylle forsigtigt med klorhexidin fra i morgen. Skyl i 1 minut to gange dagligt i 7 dage. Lad klorhexidinen virke i 1 time efter skylning – undgå at spise, drikke eller skylle munden.
- Tag smertestillende medicin som anbefalet: 1.000 mg paracetamol og 400 mg ibuprofen 4 gange dagligt i 4 dage. Mærk herefter, hvor meget du har brug for.
- Selvopløselige sting forsvinder typisk efter 2–3 uger. Hvis de generer, kan du få dem fjernet efter 7–10 dage.

Heling og forventninger

Smerter og hævelse toppe på dag 3–4 og aftager herefter gradvist. Et koldt kompres (ikke is direkte på huden) kan reducere hævelsen de første 24 timer. Fuld heling af bløddede sker typisk efter 2–3 uger. Knoglen regenererer over 3–12 måneder, og vi kontrollerer med røntgen efter 6–12 måneder.

Risici og mulige komplikationer

- Blødning – normalt de første timer; kontakt os ved vedvarende blødning.
- Infektion – feber, øget smerte og dårlig smag kan være tegn på infektion.
- Nervepåvirkning – midlertidig følelsesnedsættelse i det opererede område.
- Kommunikation til bihulen – mulig ved operationer i overkæben.
- Manglende heling – i nogle tilfælde kan tanden alligevel ikke reddes og må derfor fjernes.

Kontaktinformation

Specialklinik for kæbekirurgi

Telefon: 82 82 86 00

E-mail: hej@specialkliniksilkeborg.dk

Adresse: Torvet 11, 2., 8600 Silkeborg

Ved blødning eller akut infektion uden for åbningstiden kontaktes vagtlægen.