

Implantatindsættelse

Om indgrebet

Et tandimplantat er en titaniumskrue, der indsættes i kæbeknoglen og fungerer som en kunstig tandrod. Oven på implantatet monteres efterfølgende en krone, bro eller proteseforankring. God mundhygiejne og tilstrækkelig knogle er forudsætninger for et vellykket resultat.

Indgrebet udføres i lokalbedøvelse og tager typisk 30–90 minutter afhængigt af antallet af implantater og kæbens anatomi.

Efter behandlingen

- Undgå at spytte, suge, skylle kraftigt eller røre ved operationsstedet de første 24 timer.
- Spis kold, blød kost i de første 24 timer. Spis herefter blød mad i 5 dage.
- Undgå rygning i mindst 8 uger – rygning øger risikoen for implantatsvigt markant.
- Start med at skylle forsigtigt med klorhexidin fra i morgen. Skyl i 1 minut to gange dagligt i 7 dage. Lad klorhexidinen virke i 1 time efter skylning – undgå at spise, drikke eller skylle munden.
- Begynd at børste forsigtigt omkring helingsskruen efter 7 dage.
- Tag smertestillende medicin som anbefalet: 1.000 mg paracetamol og 400 mg ibuprofen 4 gange dagligt i 4 dage. Mærk herefter, hvor meget du har brug for.
- Undgå sportsaktivitet de første 3–5 dage.
- Selvopløselige sting forsvinder typisk efter 4–5 uger. Vi fjerner dem dog ved kontrollen efter 2 uger.

Heling og forventninger

Smerter og hævelse toppe på dag 3–4 og aftager herefter gradvist. Titaniumimplantatet vokser fast til knoglen (osseointegration) over 6–12 uger i underkæben og 12–16 uger i overkæben, inden kronen kan monteres.

Risici og mulige komplikationer

- Blødning – normalt de første timer; kontakt os ved vedvarende blødning.
- Infektion – feber, øget smerte og dårlig smag kan være tegn på infektion.
- Implantatsvigt – manglende osseointegration; risikoen er særligt høj ved rygning og diabetes.
- Nervepåvirkning – midlertidig eller i sjældne tilfælde permanent følelsesløshed i læbe, kind eller tunge.
- Kommunikation til bihulen – en sjælden komplikation ved implantater i overkæben.

Kontaktinformation

Specialklinik for kæbekirurgi

Telefon: 82 82 86 00

E-mail: hej@specialkliniksilkeborg.dk

Adresse: Torvet 11, 2., 8600 Silkeborg

Ved blødning eller akut infektion uden for åbningstiden kontaktes vagtlægen.