

Biopsi

Om indgrebet

En biopsi er en lille vævsprøve, der udtages fra mundslimhinden eller kæbeknoglen og sendes til mikroskopisk undersøgelse (histopatologi). Det er den eneste sikre måde at stille en diagnose ved uklare forandringer. At der tages en biopsi, er ikke ensbetydende med kræft – de fleste biopsier viser godartede forandringer.

Indgrebet udføres i lokalbedøvelse og tager typisk 10–20 minutter.

Efter behandlingen

- Undgå at røre, gnubbe eller stimulere prøvestedet de første 24 timer.
- Spis blød kost og undgå stærkt krydret eller sur mad de første 2–3 dage.
- Undgå rygning i mindst 5 dage – det hæmmer heling og øger infektionsrisikoen.
- Start med at skylle forsigtigt med klorhexidin fra i morgen. Skyl i 1 minut to gange dagligt i 7 dage. Lad klorhexidinen virke i 1 time efter skylning – undgå at spise, drikke eller skylle munden.
- Tag smertestillende medicin ved behov: 1.000 mg paracetamol og 400 mg ibuprofen 4 gange dagligt. Mærk herefter, hvor meget du har brug for.
- Selvopløselige sting forsvinder typisk efter 2–3 uger. Hvis de generer, kan du få dem fjernet efter 7–10 dage.

Heling og forventninger

Smerter og ømhed er typisk milde og aftager inden for 2–3 dage. Svartiden fra patologilaboratoriet er typisk 1–3 uger. Vi kontakter dig med resultatet, så snart vi modtager det, og anbefaler eventuel videre behandling.

Risici og mulige komplikationer

- Blødning – normalt de første timer; kontakt os ved vedvarende blødning.
- Infektion – tiltagende rødme, hævelse eller pus kan være tegn på infektion.
- Smerter og ømhed – typisk milde og kortvarige.
- Ardannelse – meget sjældent ved biopsiindgreb i mundhulen.

Kontaktinformation

Specialklinik for kæbekirurgi

Telefon: 82 82 86 00

E-mail: hej@specialkliniksilkeborg.dk

Adresse: Torvet 11, 2., 8600 Silkeborg

Ved blødning eller akut infektion uden for åbningstiden kontaktes vagtlægen.